

**¡ALTO! LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE MANIPULAR EL PRODUCTO.**

**MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

No contamine ríos, lagos y estanques con este producto o con envases o empaques vacíos.

En el caso de los derrames o desechos recogerlos con aserrín o con material absorbente y para producto sólido recoger con una pala, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

No almacene ni lo transporte junto a herbicidas, alimentos, ni utensilios de uso doméstico.

**AVISO DE GARANTÍA:**

Por estar fuera de nuestro alcance el control sobre almacenamiento, manipuleo y uso de este producto, no podemos asumir responsabilidad por daños que puedan ocasionarse. Debido a estos factores, nuestra responsabilidad alcanza únicamente a la composición química del producto y el uso recomendado tal y como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el envase se encuentre debidamente sellado.



**Stoller**

La compañía especializada  
en nutrición vegetal

**X-CYTE**

**X-CYTE**

**BIOESTIMULANTE**

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

**p/p**

**Ingredientes Activos**

**Citoquinina (como Kinetina) .....0.04 %**

**Ingredientes Inertes .....99.96 %**

**TOTAL: .....100.00 %**

**Contiene 400 ppm de Citoquinina, (equivalente a 400 microgramos de Citoquinina) como ingrediente activo por litro de producto comercial.**

**CONTENIDO NETO: ( ) 1 LITRO ( ) 3.785 LITROS**

**FABRICADO POR:**

**STOLLER ENTERPRISES, INC**  
BLVD. TIMOTEO LOZANO No. 411  
COL. LAS MARGARITAS LEÓN GUANAJATO  
C.P. 37476, MÉXICO  
TEL 4-712-85 51, FAX 4-770-49 05

**STOLLER ENTERPRISES, INC**  
KATY FREEWAY 8980 SUITE 200  
HOUSTON, TEXAS. 77024 USA  
TEL 713 461 - 14 93, FAX 713 461 - 44 67

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**  
**AGRO PRO CENTROAMÉRICA, S.A.**  
TEL.: 2279-8485 TRES RÍOS, CARTAGO, C.R.  
agropro@agroproca.com www.agroproca.com

**NO USE EL PRODUCTO EN FORMA DIFERENTE A LO INDICADO EN ESTA ETIQUETA.**

**INSTRUCCIONES DE USO:**

X-CYTE puede aplicarse a todo aquel cultivo que presenta estados de estrés por trasplante, clima, suelo, intoxicaciones con herbicidas, toxicidad de Nitrógeno, bajas temperaturas.

X-CYTE posee CITOQUININAS que son HORMONAS muy importantes para el desarrollo del sistema radical, y para la diferenciación floral. También participa en un equilibrio con el las otras hormonas vegetales como Auxinas, Giberelinas y el Etileno. Además estimula la división celular.

Hortalizas: Tomate (*Lycopersicon esculentum*), Papa (*Solanum tuberosum*), Cebolla (*Allium cepa*).

Frutas: Melón (*Cucumis melo*), Sandía (*Citrullus vulgaris*), Banano (*Musa AAA*, sub grupo Cavendish), Naranja (*Citrus sinensis*), Piña (*Ananas comosus*).

Café (*Coffea arabica*).

Arroz (*Oryza sativa*).

Plantas ornamentales y Flores: Crisantemos (*Chrysanthemum morifolium*), Aglonema (*Aglonema sp*).

**Dosis:**

**Piña:** 1.2 a 3.6 litros /ha.

**Para todos los demás cultivos:**

X-CYTE se aplica a una dosis de 150 mL en 200 litros de agua, deben usarse entre 300 a 500 mL/Ha.

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:**

El envase de X-CYTE debe agitarse antes de usarse.

Lenar el tanque del equipo de aplicación hasta la mitad del volumen requerido.

Diluir la cantidad de X-CYTE a usar en un recipiente con agua antes de verterlo en el tanque del equipo de aplicación.

Terminar de completar el volumen requerido en el equipo de aplicación.

**MÉTODO DE APLICACIÓN:**

**Para arroz y banano:** Puede utilizarse equipo aéreo, avión o helicóptero.

**Para Piña:** Aplicación Foliar.

**Para todos los demás cultivos:** X-CYTE se puede aplicar vía foliar con equipo terrestre. El equipo terrestre puede ser manual de mochila, motobomba, de riego o acoplado al tractor, o al suelo por medio del equipo de riego.

**ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:**

En plantas anuales se recomienda usar el X-CYTE en los primeros días después del trasplante. O de la emergencia de las plántulas provenientes de semilla. Una segunda aplicación se puede realizar al momento de la floración, para evitar la caída de flores. En frutales se recomienda aplicar el X-CYTE cuando los frutos apenas empiezan su desarrollo para estimular la división celular y lograr frutos de mayor tamaño.

**Para Piña:** Durante el desarrollo vegetativo, aplicar cada 14 días, según las necesidades del cultivo. Para mejorar el crecimiento de la fruta aplicar en postfloración.

**PAÍS**  
COSTA RICA

**NÚMERO DE REGISTRO**  
4229

**FECHA DE REGISTRO**  
16/08/2001

**NÚMERO DE LOTE:**

**FECHA DE FORMULACIÓN:**

**FECHA DE VENCIMIENTO:**